

Return to Basketball Guidelines Following a Concussion

If you have sustained a concussion, the trauma specialists at the Montreal Children's Hospital recommend this action plan before you put your team jersey back on for the game.

You must complete your recommended period of rest and follow the activity restrictions. Remember you should only consider returning to activity when you have had no symptoms at rest for at least one week. Follow these gradual progressive steps of the training sequence when you are ready to return to play.

STEP 1: Light general conditioning exercises:

- Begin with a sport specific warm up.
- Do a (15-20 minute) workout which can include: stationary bicycle, fast paced walking or light jog, rowing or freestyle swimming.

STEP 2: General conditioning and sport specific skill work; individually:

- Continue with the sport specific warm-up.
- Slowly increase intensity and duration of workout (20-30 minutes).
- Begin skill work within the workout.
- Begin footwork drills for offense and defense, individual ball handling, dribbling and shooting drills.

STEP 3: General conditioning, skill work; individually and with a team-mate:

- NO CONTACT
- Continue with general conditioning (up to 60 minutes). Increase intensity and duration. Begin interval training.
- Begin drills with a partner but with no contact. Continue with individual skill work as per Step 2.
- Begin partner passing and shooting drills.
- Begin walk-throughs on offense and defense.

STEP 4: General conditioning, skill work and team drills:

- Do not play live scrimmages. NO CONTACT
- Resume regular conditioning and duration of practice.
- Practice team passing and shooting drills, individual defense.
- Begin fast-break drills, set up, 3 on 2 / 2 on 1's and shell drills with no contact to the player.
- Continue with walk-throughs and run-throughs of offensive patterns and plays with no contact.
- Practice defensive coverage with no contact. Review box-out and screening techniques, with low intensity.

STEP 5: Full team practice with body contact:

- Join team in a full practice to get yourself back in the lineup. If a full practice is completed with no symptoms, you are ready to return to competition. Discuss with the coach about getting back in the next game.

There should be approximately 24 hours (or longer) in between each step. If some symptoms return at any time during this action plan, stop working out. Rest until you are symptom-free for 24 hours. Then return to step 1. If symptoms return or get worse, you are urged to seek medical attention.



L'Hôpital de Montréal pour enfants
The Montreal Children's Hospital
Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre

TRAUMA

The Montreal Children's Hospital
2300 Tupper Avenue
Montreal, Quebec H3H 1P3
www.thechildren.com
(514) 412-4400 extension 23310



Reprendre le basketball après une commotion cérébrale

Si vous avez subi une commotion cérébrale, les spécialistes en traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants recommandent cette stratégie de retour aux activités avant de remettre votre chandail d'équipe.

Vous devez compléter votre période de repos et de restrictions d'activités. Souvenez-vous que vous ne devriez songer à retourner aux activités que si vous n'avez pas de symptômes au repos depuis au moins une semaine. Suivez ces étapes une fois que vous serez prêts à entreprendre le retour au jeu.

ÉTAPE 1: Exercices de conditionnement:

- Débuter avec des exercices d'échauffement spécifiques au basketball;
- Faire une séance d'entraînement de 15 à 20 minutes qui peut comporter: bicyclette stationnaire, marche rapide ou course légère, aviron ou natation.

ÉTAPE 2: Conditionnement et habiletés spécifiques au basketball; individuellement:

- Continuer les exercices d'échauffement spécifiques au basketball;
- Augmenter légèrement l'intensité et la durée de l'entraînement (20-30 minutes);
- Commencer les exercices d'habiletés spécifiques au basketball;
- Débuter les exercices de course, de jeux de pied pour l'attaque et la défense, de maniement du ballon, de dribbler et lancer du ballon.

ÉTAPE 3: Conditionnement et habiletés spécifiques au sport; individuellement et avec un coéquipier:

- AUCUN CONTACT ;
- Continuer l'entraînement (jusqu'à 60 minutes). Augmenter l'intensité et la durée. Commencer l'interval-training;
- Débuter les exercices avec un coéquipier, mais sans contact. Continuer les exercices de l'étape 2;
- Commencer les exercices de passe et de lancer au panier avec un coéquipier;
- Commencer à revoir les jeux en attaque et en défense, au ralenti.

ÉTAPE 4: Conditionnement et habiletés spécifiques au sport; en équipe:

- Ne pas faire de mêlées en temps réel. AUCUN CONTACT;
- Reprendre les pratiques et les durées d'entraînement habituelles;
- Pratiquer les exercices de passe et de lancer en équipe, défense individuelle;
- Commencer les exercices de contre-attaque, 3 contre 2 / 2 contre 1 et de défensive collective « shell drills » sans contact;
- Continuer à revoir les jeux en attaque avec plus de vitesse, mais sans contact;
- Pratiquer les tactiques défensives sans contact. Réviser les techniques pour faire un écran et le « box-out » pour le rebond, de très faible intensité.

ÉTAPE 5: Pratique complète avec contact corps à corps:

- Reprendre une pratique complète pour prendre votre place dans l'alignement. Si une pratique peut être complétée sans symptômes, vous êtes prêts pour le retour à la compétition. Discuter avec l'entraîneur de votre retour au jeu.

Il devrait y avoir au moins 24 heures (ou plus) entre chaque étape. Le retour des symptômes à n'importe quel moment de cette progression signifie l'arrêt de l'entraînement. Reposez vous jusqu'à la disparition des symptômes pendant 24 heures et recommencez à l'étape 1. Si les symptômes reviennent ou s'aggravent vous devez consulter votre médecin.



L'Hôpital de Montréal pour enfants
The Montreal Children's Hospital
Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre

TRAUMATOLOGIE

L'Hôpital de Montréal pour enfants
2300, rue Tupper
Montréal, Québec H3H 1P3
www.thechildren.com/fr
(514) 412-4400 poste 23310

